


ASOS est une étude transversale, réalisée pendant une semaine auprès d'un échantillon national tiré au sort de 1500 pharmacies d'officine (métropole et départements d'Outre-Mer) sur la prescription d'antalgiques stupéfiants. Les objectifs sont de décrire la population traitée par antalgiques stupéfiants et les modalités de leur prescription, d'évaluer le respect des règles de prescription et de suivre l'évolution dans le temps de ces données.

RÉSULTATS 2016

En 2016, **212 pharmacies** ont participé à l'enquête (taux de participation : 14,1 %) et 599 malades ont été inclus.

Le nombre moyen de malades était de 2,83 par pharmacie par semaine.



PRESCRIPTEURS

Les médecins libéraux représentaient 81,9 % des prescripteurs, les hospitaliers, 17,9 %.

Dans 81,9 % des cas, le prescripteur était généraliste, dans 18,1 % des cas, un autre spécialiste (cancérologue : 32 %, rhumatologue : 11,5 %, chirurgien : 10,7 %, pneumologue : 7,8 %, algologue : 5,8 %, autres : 32 %).

MÉDICAMENTS


Les médicaments les plus prescrits sont :

- par DCI : morphine (38 %), oxycodone (33,3 %) et fentanyl (28,3 %).

- par spécialité : Durogésic® et génériques (25 %), Skénan® (18 %), Oxycontin® (17,8 %) et Actiskénan® (17,3 %).

Il s'agissait d'un nouveau traitement dans 19,8 % des cas, d'un traitement de plus d'un an dans 44,7 % des cas.

PRESCRIPTION DES MÉDICAMENTS PAR INDICATION



Conformité des ordonnances	%
ordonnance sécurisée	92,9
posologie en lettres	91,4
carré de sécurité rempli	90,7
espace étroit dernière ligne/signature	67


CARACTÉRISTIQUES DES MALADES

L'âge moyen était de 65,9 ans (médiane : 67 ; extrêmes : 9-100 ans) ; 37,9 % avaient 75 ans ou plus.

Il y avait 56,1 % de femmes et 43,9 % d'hommes.

INDICATIONS

Dans 64,1 % des cas, il s'agissait d'une douleur chronique et dans 21,9 % des cas, d'une douleur aiguë (dans 2,5 % des cas, les deux).



Evolution des indications, 2004-2016

CONCLUSION

La morphine reste en tête parmi les antalgiques stupéfiants suivie par l'oxycodone et le fentanyl.

Les résultats de cette 16^{ème} enquête montrent que :

- les indications rhumatologiques restent majoritaires quel que soit le médicament,
- les indications « autres » sont toujours en progression, notamment pour la morphine,
- la proportion des indications cancérologiques a nettement diminué et a atteint sa valeur la plus basse observée au cours des 10 dernières années,
- les prescriptions hors AMM de fentanyl d'action rapide sont toujours élevées,
- le nombre de malades sous oxycodone est croissant depuis plusieurs années avec une augmentation des indications rhumatologiques qui deviennent majoritaires. En revanche, dans les indications cancérologiques, tous médicaments confondus, l'oxycodone garde la première place.

Le réseau des centres d'Addictovigilance remercie chaleureusement tous les pharmaciens ayant participé à l'enquête ASOS 16